

VÆLG DET RIGTIGE ØREPRODUKT TIL DIN PATIENT

Anvendelsesområde/egenskab

Produkt	Anvendelsesområde/egenskab						pH	Indhold
	Understøttende ørerens	Voksløsende	Overvækst af gærsvamp	Overvækst af grampositive bakterier +/- gærsvamp	Overvækst af hovedsageligt gramnegative bakterier	Lindrer inflammation og kløe		
CleanAural Hund	•	•	•	•			Neutral	Propylenglykol, isopropylalkohol
CleanAural Hund Sensitive	•	•	•	•			Neutral	Glycerin, kamille, Yucca Vera
CleanAural Kat	•	•	•	•	•	•	Neutral	Glycerin, propylenglykol, chlorotymol
CerumAural		•					Neutral	Skvalen (vegetabilsk)
MalAcetic Aural		•	•	•			Sur	2 % eddikesyre, 0,2 % borsyre
TrizAural					•		Basisk	Triz-EDTA
TrizChlor			•	•	•		Basisk	0,15 % Chlorhexidingluconat, Triz-EDTA
Canaural® vet			•	•		•	Neutral	Fusidinsyre, framycetin, nystatin, prednisolon
DuOtic®			•	•		•		Betamethason, terbinafin
Osumnia®			•	•	•	•		Betamethason, terbinafin, florfenicol
Recicort® vet		•				•	Sur	Salicylsyre, triamcinolon

Canaural Vet. øredråber, suspension. **Aktive stoffer:** Diethanolaminfusidat 5,0 mg, framycetinsulfat 5,0 mg, nystatin 100.000 IE, prednisolon 2,5 mg. Rx. **ATC vet-kode:** QS 02 CA 01. **Dyrearter:** Hund. **Terapeutiske indikationer:** Otitis externa hos hund. **Kontraindikationer:** Må ikke anvendes til hunde med perforeret trommehinde. Må ikke anvendes til hunde med kendt overfølsomhed for indholdsstofferne. **Særlige advarsler for hver dyreart:** Betændelse i øregangen forårsaget af bakterier og svampe er ofte af sekundær natur. Den til grund liggende årsag bør derfor diagnosticeres og behandles. Efter behandlingen skal ørene checkes med jævnlige intervaller for symptomer på reinfektion. **Særlige forsigtighedsregler for dyret:** Kun til udvortes brug. Brug af lægemidlet bør baseres på identifikation af de inficerede organismer og resistensbestemmelse samt tage højde for officielle lokale antibiotika politikker. Brug af dette lægemiddel, der afviger fra instruktionerne i produktresuméet kan føre til øget forekomst af bakterier, der er resistente overfor fusionsinsyre eller framycetin sulfat. Langvarig og intensiv brug af topiske kortikosteroider er kendt for at udløse lokale og systemiske effekter, inklusive nedsat binyrefunktion, atrofi af epidermis og forlænget helegstid. Inden lægemidlet appliceres skal den ydre øregang omhyggelig inspiceres for at sikre, at trommehinden ikke er perforeret og dermed undgå risikoen for at overføre infektionen til mellemøret og forebygget skade på det cochleære- og vestibulære apparat. Hvor der er tale om en øremide infektion skal det overvejes at behandle begge ører, selvom infektionen kun er tilstedeværende i det ene øre. **Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:** Vask omhyggeligt hænderne efter håndtering af lægemidlet. Undgå hudkontakt. I tilfælde af utilsigtet eksponering skylles det berørte område med rigelige mængder vand. Personer med kendt overfølsomhed for indholdsstofferne skal undgå kontakt med lægemidlet. **Bivirkninger:** Hypersensitivitetsreaktioner kan forekomme. Bruget af præparatet i det ydre øre kan forårsage nedsat hørelse, primært i ældre hunde. Hvis dette iagttages, skal behandlingen afbrydes. **Drægtighed eller diegivning:** Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. **Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:** Ingen kendte. **Dosering og indgivelsesmåde:** Flasken kun OMYRYSTES for brug. Det anbefales at rense og tørre den ydre øregang før behandling og overskydende hårvækst omkring behandlingsområdet bør fjernes. 5-10 dråber i øregangen 2 gange daglig i 10-14 dage. Øret bør masseres forsigtigt efter inddryppingen for at opnå en god fordeling af dråberne i øregangen. **Tilbageholdelsestid:** Ikke relevant. **Emballage:** Plastflaske med dråbespids. Pakningsstørrelser 1x15 ml, 1x25ml, 10x25ml. **Indehaver af markedsføringstilladelsen:** Dechra Veterinary Products A/S. **Repræsentant:** Dechra Veterinary Products A/S. **Dato for første tilladelse:** 8. september 2016. **Udleveringsbestemmelse:** B. **Ovenstående tekst er et forkortet resumé af sammendraget af produkttegenskaber. For yderligere information se venligst på www.medicintil dyr.dk eller kontakt www.dechra.dk. Dagsaktuel pris kan ses på www.medicinpriser.dk.**

DuoTic øregel til hunde. **Aktivt stof:** 1 dosis (1,2 g) indeholder: Terbinafin 10 mg, betamethasonacetat 1 mg. Rx. **ATCvet-kod:** QS02CA90. **Dyrearter:** Hund. **Indikationer:** Behandling af otitis externa forårsaget af *Malassezia pachydermatis*. **Kontraindikationer:** Må ikke anvendes, hvis trommehinden er perforeret eller til hunde med generaliseret demodicose. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, andre kortikosteroider eller et eller flere af hjælpestofferne. Må ikke anvendes, hvis trommehinden er perforeret eller hunde med generaliseret demodicose. **Særlige forsigtighedsregler for dyret:** Anvendelse af lægemidlet skal baseres på identifikation og følsomhedstest af måtpatogenet. Produktets sikkerhed er ikke fastlagt i hunde, der er under 2 måneder gamle eller vejer under 1,4 kg. Betamethason kan optages systemisk hvorfor forsigtighed bør udvises ved brug til hunde med formodet eller bekræftet endokrin lidelse. Yderligere samtidige behandlinger med kortikosteroider skal undgås. Produktet kan være irriterende for øjnene. Hundeejer bør anbefales at overvåge okulære tegn i de timer og dage, der følger efter påføring af produktet. Ikerheden og effekten af veterinærlægemidlet hos katte er ikke evalueret. **Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:** Produktet kan være irriterende for øjnene. Utilsigtet kontakt med øjnene kan forekomme, når hunden ryster på hovedet under eller lige efter administrering. Derfor anbefales det, at produktet kun administreres af dyrlæge eller under deres nøje tilsyn. I tilfælde af utilsigtet okulær eksponering, skyl øjnene grundigt med vand i 10 til 15 minutter. I tilfælde af utilsigtet hudkontakt, vask udsat hud grundigt med vand. I tilfælde af utilsigtet indtagelse skal der straks søges lægehjælp. **Bivirkninger:** Forhøjede leverenzymen kan forekomme. I meget sjældne tilfælde er døvhed eller nedsat hørelse, som regel forbigående, rapporteret hos hovedsageligt ældre hunde. I meget sjældne tilfælde kan reaktioner på påføringsstedet (fx rødme, kløe, smerte) samt overfølsomhedsreaktioner overfor indholdsstofferne forekomme. **Drægtighed eller diegivning:** Må ikke anvendes til avlsdyr samt under drægtighed og laktation. **Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:** Der er ikke demonstreret forlængelse med andre ørerensningsmidler end saltvand. **Dosering og indgivelsesmåde:** Til anvendelse i øret. Det anbefales at rense og tørre den ydre øregang inden første anvendelse af produktet. Anvend én tube pr. inficeret øre. Gentag behandlingen efter 7 dage. Det maksimale kliniske respons ses måske først 21 dage efter den anden behandling. **Pakningsstørrelser:** Engangstube i karton med 20 tube. **Indehaver af markedsføringstilladelsen:** Dechra Regulatory B.V. **Repræsentant:** Dechra Veterinary Products A/S. **Dato for første tilladelse:** 22.11.2024 **Udleveringsbestemmelse:** B. **Ovenstående tekst er et forkortet resumé af produktresuméet. For yderligere information se venligst på www.medicintil dyr.dk eller kontakt www.dechra.dk. Dagsaktuel pris kan ses på www.medicinpriser.dk.**

Osurnia øregel til hunde. **Aktivt stof:** 1 dosis (1,2 g) indeholder: Terbinafin 10 mg, flufenicol 10 mg, betamethasonacetat 1 mg. Rx. **ATCvet-kod:** QS02CA90. **Dyrearter:** Hunde. **Indikationer:** Behandling af akut otitis externa og akut forværring af recidiverende otitis externa forårsaget af *Staphylococcus pseudintermedius* samt *Malassezia pachydermatis*. **Kontraindikationer:** Skal ikke anvendes, ved tilfælde af overfølsomhed overfor aktive stoffer, hvis trommehinden er perforeret, ved tilfælde af generaliseret demodicose eller til drægtige dyr og avlsdyr. **Særlige forsigtighedsregler for dyret:** Anvendelse af lægemidlet skal om muligt baseres på identifikation af de inficerende organismer og på følsomhedstest. Produktets sikkerhed er ikke fastlagt i hunde, der er under 2 måneder gamle eller vejer under 1,4 kg. Betamethason kan optages systemisk hvorfor forsigtighed bør udvises ved brug i hunde med formodet eller bekræftet endokrinologisk lidelse. Produktet kan være irriterende for øjnene. Sikkerheden og effekten af veterinærlægemidlet hos katte er ikke evalueret. **Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:** Produktet kan være irriterende for øjnene hos personer der indgiver lægemidlet til dyr. Utilsigtet kontakt med øjne kan forekomme, når hunden ryster på hovedet under eller lige efter administrering. I tilfælde af utilsigtet okulær eksponering, skyl øjnene grundigt med vand i 10 til 15 minutter. I tilfælde af utilsigtet hudkontakt, vask udsat hud grundigt med vand. I tilfælde af utilsigtet indtagelse af produktet, søg straks lægehjælp og vis indlæggelsen. **Bivirkninger:** I meget sjældne tilfælde er døvhed eller nedsat hørelse, som regel forbigående, rapporteret hos hunde, hovedsageligt ældre hunde, viser erfaring efter godkendelse. Reaktioner på administrationsstedet (dvs. Rødme, smerter, kløe, ødem og sår), overfølsomhedsreaktioner (herunder ansigtødem, nældefeber og shock) samt øjenlidelser såsom neurogen keratoconjunctivitis sicca, keratoconjunctivitis sicca, hornhindeindre, blefarospasme, øjenrødme og okulært udfald er blevet rapporteret i meget sjældne tilfælde. Ataksi, forstyrrelser i indre øre, ansigtsskælv og nystagmus er blevet rapporteret i meget sjældne tilfælde. **Drægtighed eller diegivning:** Brug ikke produktet under drægtighed og laktation. **Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:** Der er ikke demonstreret forlængelse med andre ørerensningsmidler end saltvand. **Dosering og indgivelsesmåde:** Til anvendelse i øret. Det anbefales at rense og tørre den ydre øregang inden første anvendelse af produktet. Det frarådes at gentage rensningen af ørerne før 21 dage efter næste anvendelse af produktet. Anvend én tube pr. inficeret øre. Gentag behandlingen efter 7 dage. Det maksimale kliniske respons ses måske først 21 dage efter den anden behandling. **Pakningsstørrelser:** Engangstube i karton med 2 eller 20 tube. **Indehaver af markedsføringstilladelsen:** Dechra Regulatory B.V. **Repræsentant:** Dechra Veterinary Products A/S. **Dato for ændring af teksten:** 16.07.2021. **Udleveringsbestemmelse:** B. **Ovenstående tekst er et forkortet resumé af sammendraget af produkttegenskaber. For yderligere information se venligst på www.vetisearch.dk eller kontakt www.dechra.dk. Dagsaktuel pris kan ses på www.vetisearch.dk.**

Recicort Vet. øredråber, opløsning. **Aktive stoffer:** Triamcinolonacetonid 1,77 mg, Salicylsyre 17,7 mg. **Dyrearter:** Hunde og katte. Rx. **ATCvet-kode:** QD 07 XB 02. **Terapeutiske indikationer:** Behandling af otitis externa. Symptomatisk behandling af seborrhoisk dermatitis i det ydre øre. **Kontraindikationer:** Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for kortikosteroider, salicylsyre eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bør ikke anvendes til dyr med perforeret trommehinde. Bør ikke anvendes til hunde med demodicose. **Særlige advarsler:** Det er vigtigt for en effektiv behandling af otitis externa, at ørekanalen for første behandling renses omhyggeligt og tørres for at fjerne cerumen og/eller eksudat. Kraftig hårvækst omkring området, der skal behandles, skal om nødvendigt klippes. For en effektiv behandling af seborrhoisk dermatitis skal eksisterende skæl og afskalninger fjernes. Det kan være nødvendigt at klippe håret, der omgiver eller dækker læsionerne, så veterinærlægemidlet kan trænge ind i den angrebne hud. Seborrhoisk dermatitis kan være en primær lidelse, men kan også opstå som et resultat af underliggende sygdomme eller sygdomsprocesser (f.eks. allergiske lidelser, endokrine lidelser, neoplasier), hvor otitis externa kun meget sjældent er primær, og hovedsageligt forekommer som følge af forskellige underliggende årsager (prædisponerende og vedvarende faktorer, neoplasier). Derfor er det væsentligt at identificere en evt. underliggende sygdomsproces og påbegynde særlig behandling, hvis det menes nødvendigt. Endvidere opstår der typisk samtidige infektioner (bakterielle, parasit- eller svampeinfektioner) med seborrhoic dermatitis eller otitis externa, og disse bør identificeres inden behandlingen påbegyndes og behandles specifikt, hvis det menes nødvendigt. **Særlige forsigtighedsregler for dyret:** Den maksimale dosis, der kan administreres er 7 dråber pr. kg kropsvægt pr. dag. Den anbefalede behandling (8-10 dråber pr. øre, en eller to gange dagligt) må ikke overstige 7 dråber pr. kg kropsvægt pr. dag. Vær omhyggelig med ikke at overskride denne mængde, særligt når der behandles mindre dyr eller når begge ører kræver behandling. Ved otitis externa med en infektiøs komponent (bakterielle, parasit- eller svampeinfektioner), skal en særlig behandling administreres, hvis det vurderes nødvendigt. Systemiske kortikosteroidvirkninger er mulige, særligt hvis veterinærlægemidlet indtages ved slikning. Oral indtagelse (herunder slikning) af lægemidlet hos dyr, der behandles, eller dyr, der har kontakt med behandlede dyr, bør undgås. Yderligere kortikosteroidbehandling må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet. Anvendes med forsigtighed hos dyr, der formodes at have eller har endokrine lidelser (dvs. diabetes mellitus, hypo- eller hyperthyroidisme, hyperadrenokorticisme, osv.). Da glukokortikosteroider er kendt for at forsinke væksten, skal anvendelsen hos unge dyr (under 7 måneder) være baseret på den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet og underkastet regelmæssige, kliniske gentagne vurderinger. Vær omhyggelig med at undgå kontakt med øjne. Veterinærlægemidlet må ikke appliceres på beskadiget hud. Hvis der opstår overfølsomhed over for en eller flere af komponenterne, skal øret skylles omhyggeligt. **Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:** Dette veterinærlægemiddel indeholder triamcinolonacetonid, salicylsyre og ethanol og kan være skadeligt for børn efter utilsigtet indtagelse. Efterlad ikke veterinærlægemidlet uden opsyn. I tilfælde af selvindgivelse ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlæggelsen eller etiketten bør vises til lægen. Dette veterinærlægemiddel kan være irriterende for huden og inducere overfølsomhedsreaktioner. Ved overfølsomhed over for kortikosteroider eller salicylsyre bør kontakt med veterinærlægemidlet undgås. Undgå hudkontakt med veterinærlægemidlet. Bær uigennemtrængelige engangshandsker, når du håndterer produkter, herunder når du gnubber dyrets angrebne hudområde. Hvis du kommer i kontakt med veterinærlægemidlet, vaskes hænder og udsat hud, og der søges lægehjælp ved overfølsomhedsreaktioner eller vedvarende irritation. Dette veterinærlægemiddel kan irritere øjnene. Undgå kontakt med øjnene, herunder hånd-til-øje-kontakt. Hvis øjnene kommer i kontakt med veterinærlægemidlet, skylles med rent vand. Hvis øjenirritationen vedvarer, søges lægehjælp, og indlæggelsen eller etiketten bør vises til lægen. Dette veterinærlægemiddel kan være skadeligt for det ufødte barn. Da veterinærlægemidlet kan absorbere gennem huden, må gravide kvinder og kvinder i den fødegygtige alder ikke håndtere lægemidlet eller holde dyr under behandling og skal undgå kontakt med det behandlede dyrs ører indtil mindst 4 timer efter appliceringen. Nyligt behandlede dyr bør ikke håndteres, og børn bør ikke få lov til at lege med nyligt behandlede dyr, indtil det behandlede område i pelsen er tørt. Det anbefales, at nyligt behandlede dyr ikke bør gives lov til at sove sammen med deres ejere, særligt husets børn. **Bivirkninger:** Langvarig og omfattende anvendelse af topiske kortikosteroidpræparater er kendt for at udløse lokale og systemiske virkninger, herunder suppression af binyrefunktion, udtørring af epidermis og forsinket ophealing. I sjældne tilfælde er der rapporteret rødme og hudskalet. **Hypigheden af bivirkninger er defineret som:** Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr), der viser bivirkninger i løbet af en behandling). Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr). Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr). Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr). Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter). **Drægtighed eller diegivning:** Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet. **Dosering og indgivelsesmåde:** Til anvendelse i øret og kutant (øremuslingen). Ørekanalen: Rens den ydre ørekanal og øremuslingen. Den anbefalede behandlingsdosis er 8-10 dråber instilleret i de(n) angrebne ørekanal(er), en eller to gange dagligt. Massér øret og øregangen grundigt, men forsigtigt for at sikre korrekt fordeling af veterinærlægemidlet. Behandlingsdosen (8-10 dråber pr. øre, en eller to gange dagligt) må ikke overstige 7 dråber pr. kg kropsvægt pr. dag. Vær omhyggelig med ikke at overstige denne mængde, særligt når små dyr behandles, eller når begge ører kræver behandling. Behandlingen skal fortsættes uden afbrydelse indtil nogle få dage efter, at de kliniske symptomer er forsvundet helt, men ikke længere end 14 dage. Hvis otitis externa ikke forbedres efter 3 dages behandling, skal behandlingen tages op til fornyet overvejelse. Øremuslingen: Til behandling af seborrhoisk dermatitis i øret appliceres to gange dagligt et tilstrækkeligt antal dråber i ørets overflade, så det angrebne område er dækket, når det spredt sig. Om nødvendigt gnides veterinærlægemidlet forsigtigt ind i området, så det kan trænge ind til hele det angrebne hudområde. Lad området tørre. Ved alvorlige tilfælde kan virkningen af veterinærlægemidlet øges ved at applicere et andet og tredje lag umiddelbart efter, at det første lag er tørret, hvis det samlede antal dråber ikke overstiger den maksimale dosis på 7 dråber pr. kg kropsvægt pr. dag. Vær omhyggelig med ikke at overskride denne dosis, når små hunde og katte behandles. Behandlingen skal fortsættes uden afbrydelse indtil nogle få dage efter, at de kliniske symptomer er forsvundet helt, men ikke længere end 14 dage. **Overdosering:** Langvarig anvendelse af høje doser triamcinolon kan fremkalde binyreinsufficiens. **Tilbageholdelsestid:** Ikke relevant. **Emballage:** Åske med en 20 ml hvid dråbepipetteflask af LDP med en hætte af HDPE. **Indehaver af markedsføringstilladelsen:** Le Vet Beheer B.V. **Repræsentant:** Dechra Veterinary Products A/S. **Pakninger/priser:** Dagsaktuel pris kan ses på www.medicinpriser.dk. **Dato for ændring af teksten:** 13. december 2021. **Udleveringsbestemmelse:** B. **Teksten ovenfor er en forkortelse af produktresumén. For yderligere information se venligst på www.medicintil dyr.dk eller kontakt www.dechra.dk. Dagsaktuel pris kan ses på www.medicinpriser.dk.**