

Udfordringer løses bedst som et team

Når hunde, ejere og dyrlæger samarbejder, trækker Cushings det korteste strå.



Mere information: www.dechra.dk

Vetoryl 5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 120 mg hårde kapsler. Aktivt stof: Trilostan. ATCvet-kod: QH02CA01. Rx. Dyrearter: Hund. Til behandling af hypofyse- og adrenal-betinget hyperadrenocorticisme (Cushings syndrom). Bør ikke anvendes til dyr, som lider af primær leversygdom og/eller nyreinsufficiens. Da de fleste tilfælde af hyperadrenocorticisme konstateres hos hunde, der er mellem 10 og 15 år gamle, vil der ofte også være andre patologiske forandringer til stede. Regelmæssig overvågning bør foretages. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Lægemidlet bør ikke håndteres af gravide kvinder, eller af kvinder der forsøger at blive gravide. Vask hænderne med vand og sæbe efter kontakt med kapslerne. **Bivirkninger:** Symptomer, som skyldes iatrogen hypoadrenocorticisme, herunder svaghed, lethargi, anoreksi, opkastning og diarre, kan forekomme især, hvis hunden ikke er blevet overvåget tilstrækkeligt. Addisons krise kan også forekomme. Må ikke anvendes til drægtige eller dælgivende tæver eller i nogen dyr til avl. **Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:** Muligheden for interaktion med andre lægemidler er ikke undersøgt specifikt. Dosering og indgivelsesmåde: Indgives oralt en gang om dagen sammen med foder. Startdosis for behandlingen er ca. 2 mg / kg/dag, i forhold til mulige kombinationer af kapselstørrelser. Dosistitrer i forhold til den individuelle respons som lægges fast gennem monitorering. Yderligere oplysninger om overvågning og opfølgning kan fås ved at kontakte producenten eller læse mere i SPC alt www.medicintil dyr.dk. **Pakningsstørrelser:** Hårde kapsler i blisterkarton 30 (3x10) st. **Indehaver af markedsføringstilladelsen:** Dechra Regulatory B. V. **Repræsentant:** Dechra Veterinary Products A/S. **Dato for ændring af teksten:** 26.08.2019. **Udleveringsbestemmelse:** B. Ovenstående tekst er et forkortet resumé af sammendraget af produkttegenskaber. For yderligere information se venligst på www.medicintil dyr.dk eller kontakt www.dechra.dk. Dagsaktuel pris kan ses på www.medicinpriser.dk.

Cushings syndrom

- vurdering af kliniske symptomer

Udviser hunden tegn på, at den ikke har det godt?

Udviser hunden tegn på dårlig sygdomskontrol?

Tørst/vandladning



Udseende



Appetit




Aktivitetsniveau



Livskvalitet – QoL

Vurdér situationen individuelt, både fra et patient- og ejerperspektiv.

Brug et videnskabeligt valideret værktøj, CushQoL-pet, til at hjælpe dig med din kommunikation.



Klinisk undersøgelse

En god mulighed for at se efter symptomer, der indikerer, at hunden ikke har det godt og/eller at den kan have en anden sygdom på samme tid.

Du kan også få et indtryk af, om det, som kæledyrsejeren fortæller, synes at være i overensstemmelse med din kliniske vurdering.

Kortisolmåling



Min patient har det ikke godt
(opkastning, diarré, appetitløshed)

ACTH-stimuleringstest



Min patient har symptomer på
Cushings syndrom

Præ-Vetoryl kortisoltest



Min patient har det godt

Præ-Vetoryl-kortisoltest

Da Præ-Vetoryl Kortisolmåling ikke nævnes i produktresumeeet for Vetoryl, er samtykke og forståelse mellem dyrlægen og dyreejeren nødvendigt. Det er en off-label anbefaling.