




Felimazole® Vet. behandling og monitorering



Diagnosticering af felin hyperthyreoidisme



FELIMAZOLE® VET.
THIAMAZOL



Dechra
Veterinary Products

Felimazole Vet. 1,25 mg, 2,5 mg og 5 mg, overtrukne tabletter. **Rx. Aktivt stof:** Thiamazol. **Dyreart:** Kat. **Indikationer:** Til stabilisering af hyperthyreoidisme hos katte forud for operativ thyroidektomi. Til langtidsbehandling af hyperthyreoidisme hos katte. **Kontraindikationer:** Bør ikke anvendes til katte, der lider af systemiske sygdomme, som f.eks. primær leversygdom eller diabetes mellitus. Bør ikke anvendes til katte, der udviser tegn på autoimmun sygdom. Bør ikke anvendes til dyr med forstyrrelser af de hvide blodlegemer, som f.eks. neutropeni og lymfopeni. Bør ikke anvendes til dyr med trombocytopatier og koagulationsdefekter (specielt trombocytopeni). Bør ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for thiamazol eller hjælpestoffet polyethylenglycol. Bør ikke anvendes til drægtige og lakterende hunnkatter. **Særlige forsigtighedsregler for dyret:** Hvis en døgndosis, som overstiger 10 mg pr. dag er nødvendig, skal dyrene overvåges særligt omhyggeligt. Brug af lægemidlet til katte med renal dysfunktion bør kun ske efter en omhyggelig risk/benefit-vurdering foretaget af den behandlende dyrlæge. Da thiamazol kan have en nedsættende virkning på glomerulusfiltrationshastigheden, bør behandlingens virkning på nyrefunktionen **Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:** Vask hænderne med sæbe og vand efter håndtering af kattegrus anvendt af de behandlede dyr. Tabletterne må ikke deles eller knuses. Eftersom thiamazol er et formodet humant teratogen, bør kvinder i den fødedygtige alder og gravide kvinder bære handsker under håndtering af kattebakker fra behandlede katte. Gravide kvinder bør bære handsker under håndtering af lægemidlet. monitoreres tæt, idet der kan forekomme forværring af en tilgrundliggende tilstand. **Bivirkninger:** Der er blevet rapporteret uønskede reaktioner efter langtidsbehandling af hyperthyreoidisme. I mange tilfælde kan symptomerne være milde og kortvarige, og vil ikke give årsag til ophør med behandlingen. De mere alvorlige virkninger ophæves i alt væsentligt, når medicineringen ophører. **Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:** Samtidig behandling med fenobarbital kan eventuelt reducere thiamazols kliniske virkning. Det er konstateret, at thiamazol reducerer den hepatiske oxidering af benzimidazole-baserede ormemidler og kan eventuelt medføre forhøjelse af disses plasmakoncentrationer ved samtidig indgivelse. Thiamazol er immunmodulerende, hvilket der skal tages højde for ved overvejelse af vaccinationsprogrammer. **Dosering og indgivelsesmåde:** Til oral anvendelse. Til stabilisering af hyperthyreose hos katte forud for kirurgisk thyroidektomi og til langtidsbehandling af hyperthyreose hos katte, er den anbefalede startdosis 5 mg per dag. Hvor det er muligt skal den daglige dosis opdeles i to og indgives morgen og aften. Tabletterne må ikke deles. Hæmatologi, biokemi og total T4 i serum bør vurderes før behandlingsstart og efter 3 uger, 6 uger, 10 uger, 20 uger, og derefter hver 3. måned. For langtidsbehandling af hyperthyreose skal dyret behandles på livstid. **Emballage:** Pakningsstørrelser: 100 tabletter. Et blisterark indeholder 25 tabletter. Hver æske indeholder 4 blisterark. **Indehaver af markedsføringstilladelsen:** Dechra Regulatory B.V. **Lokal repræsentant:** Dechra Veterinary Products A/S. **Pakninger/priser:** 1,2mg 100tablt, 2,5mg 100tablt, 5mg 100 tablt. Dagsaktuel pris kan ses på www.medicinpriser.dk. **Dato for ændring af teksten:** 26. August 2019. **Udleveringsbestemmelse:** B. **Ovenstående tekst er et forkortet resume af produktresuméet. For yderligere information se venligst på www.medicintil dyr.dk eller kontakt www.dechra.dk.**